

MÁRK elfogadott HD ED szűrő és értékelő állomások

1. Dr. Magos Zsuzsanna és Zwillinger András 3561 Felsőzsolca, Hősök tere 5. Tel: 06 46 383 205, Web:

<https://magosrendelo.hu/web/>

PEGI-VET Kft. (Dr. Pelbát József, Dr. Gippert Róbert) 7200. Dombóvár, Zalka M.u.14. Tel: +36/74.465709, Web:

<https://kutya-portal.hu/dr-pelbat-jozsef-kisallatgyogyasz-dombovar-kaposvar/>

Dr. Kocsis Gábor (8200 Veszprém, Endrődi u. 11.) Tel :06-88-444528, 06.30.6472045, Web:

<http://www.kisallatorvos.hu/allatorvos/dr-kocsis-gabor-allatorvosi-rendeloje>

Dr. Tolnai György Rendelő:9028 Győr Szent Imre 91/A Telefon:06-96-518-652, mobil: 06-20/9535126 Web:

<http://www.allatdokigyor.hu/index.html>

Dr. Stájer Attila, Rendelő: 2230 Gyömrő, Szt. István u. 44.Tel:06-29-330340, 06-20-9274-519

6. Állatkórház Nyíregyháza Rendelő:4551. Nyíregyháza. Nyíregyházi u.6/A, Tel: +36/20.9739139 vagy Web:

<http://www.allatkorhaznyiregyhaza.hu/>

Dr.Sebő Ottó Rendelő: 6900 Makó Eötvös utca 21. Tel: +36209571993 Web:

<http://www.kisallatambulancia.com/>

8. Dr. Oltyán László Rendelő: 1172. Budapest Ferihegyi ut 232. Tel: +36/30.6250243 Web:

<http://www.oltyan-vet.hu/rendelonk.php>

Dr. Siver László Schiab Állatgyógyászati Centrum 2030 Érd, Földmunkás utca 79. telefon: +36- 23.378219 mobil: +36-30-942-8815 telefon: +36-23-387-500 e-mail: schiab@schiab.hu Web: <http://www.schiab.hu/>

HD csípőizület értékelésről /Mentes/ HD frei (-) az olyan izület, amelynél a vápa félkör alakú, a combcsont fejet nagyrészt magába foglalja, az izületi rés keskeny, egyenletes tágulatú, a Norlberg-féle mérés szerinti szög 105 fok, vagy annál nagyobb. Az izületben, illetve környékén gyulladásra utaló tünet nincs.

Átmeneti forma/ HD Übergangsform (+/-) az izület, ha kisebb 105 foknál, de enyhén divergál az izületi rés, vagy – ha nem divergál – 100-105 fok közötti.

Enyhe fokú/ HD leicht positiv (+) a dysplasia, ha az izületi rés kissé kiszélesedett divergáló, a vápa laposabb, a combcsont fej nem teljesen szabályos kör alakú, a szög 100 fok körüli. Enyhe gyulladásra utaló tünetek is előfordulhatnak (Morgan vonal, scleroticus gyűrű, elülső vápakontúron felrakódás).

MÁRK tenyész alkalmassági vizsgán- ZTP- nem elfogadott fokozatok:

Közepes fokú/ HD Mittel (++) dysplasiánál a vápa sekély, a combcsont fej szögletes, az izületi rés széles, illetve kiszélesedő, a fej a vápából fokozottan kilóg (90-100 fokos). Az izületen és környékén osteoarthritis jelei mutatkoznak.

Súlyos fokú/ HD schwer (+++) dysplasiánál a combcsont fej deformált, luxált, illetve sublaxált (90 fok alatti), az izületi rés tág, erősen divergáló, a vápa lapos, az izületben illetve környékén arthroticusváltozások lehetnek.

ED - Könyökizület értékelés

- semmi nem utal könyökizületi diszpláziára (-) = tenyésztésre alkalmas,
- átmenetes könyökizületi diszplázia (+/-) = tenyésztésre alkalmas,
- enyhe könyökizületi diszplázia (+) = tenyésztésre alkalmas
- közepes könyökizületi diszplázia (++) = még tenyésztésre engedélyezett,
- súlyos könyökizületi diszplázia (+++) = tenyésztési tilalom.

Magyar Általános Rottweiler Klub a HMRE szűrőállomásai által kiadott eredményeket szintén elfogadja!